

BIOTRON® PLUS

BIOESTIMULANTE/FERTILIZANTE

INFORMACIÓN GENERAL	
INGREDIENTE ACTIVO	Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Hierro, Zinc, Manganeso, Cobre, Folcisteína, Agua.
NOMBRE QUÍMICO	N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Fe, Zn, Mn, Cu, Folcisteína, Agua.
GRUPO QUÍMICO	Macro y micronutrientes, bioestimulantes, y elementos acompañantes.
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN	Nitrógeno (7,20 % p/v), Fósforo (25,6 % p/v), Potasio (6,43 % p/v), Fe (0,06% p/v), Zn (0,06% p/v), Mn (0,013% p/v), Cu (0,006% p/v), Folcisteína (0,35% p/v), Agua (56,55% p/v).
MODO DE ACCIÓN	Bioestimulante- Fertilizante
FABRICANTE/FORMULADOR	Grupo Bioquímico Mexicano S.A. de C. V,
DISTRIBUIDOR EN CHILE	UPL Chile S.A.
TOXICIDAD	Producto de baja toxicidad para humanos y animales
ANTÍDOTO	No tiene antídoto específico. Tratamiento base.
AUTORIZACIÓN SAG N°	No corresponde

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

BIOTRON® PLUS es un Bioestimulante diseñado para ayudar a los cultivos a superar condiciones de estrés abiótico y estimular su crecimiento vegetativo. Además, su aporte de macro y micronutrientes suplementa al programa normal de fertilización

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO		
Cultivos	Dosis	Época de Aplicación
Cereales	1 a 2 L/ha	Aplicar con plantas de 10 cm. Repetir si es necesario, cada 21 días. Dosis de acuerdo al estado de desarrollo del cultivo
Hortalizas de hoja y crucíferas	2 L/ha	Aplicar dos semanas después del trasplante. Repetir cada 21 días, 2 a 3 veces.
Hortalizas de fruto	2 a 3 L/ha	Durante la etapa de desarrollo vegetativo, 2 a 3 aplicaciones cada 15 días. Dosis de acuerdo al estado de desarrollo del cultivo.
Frutales, Parronales y Viñas	300-500 cc/hL ó 3 – 5 L/ha	Desde inicio de brotación. Repetir 1 a 2 veces cada 10 a 15 días.
Leguminosas	2 L/ha	Un mes después de la siembra. Repetir a los 21 días.
Papa	3 L/ha	Aplicar con plantas de 30 cm de altura. Repetir cada 21 días, 2 a 3 veces.
Cultivos en general y plantaciones nuevas (vides, frutales y forestales)	5 - 10 cc/L	Durante las etapas iniciales del cultivo, cada 15 a 20 días.
Praderas	2 L/ha	Aplicar en praderas después del pastoreo, con un rezago de 7 días para que haya suficiente follaje para que absorba la aplicación. Mojamiento 100-200 L/ha.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO (CONTINUACIÓN)

Cultivos	Dosis	Época de Aplicación
Maíz	1 – 2 L/ha	Aplicar en estado de 3 a 4 hojas, repitiendo al estado de 6 a 8 hojas o 7 a 10 días después de la primera aplicación. Mojamiento 200-300 L/ha, según el estado de desarrollo del cultivo.

APLICACIÓN

BIOTRON® PLUS se aplica por aspersión. Aplique con equipos terrestres o aéreos a la dosis que se indican en el cuadro de Instrucciones de uso.

PREPARACION DE LA MEZCLA

BIOTRON® PLUS Agite el producto antes de abrir y mezcle con suficiente agua para lograr un buen cubrimiento del follaje.

INCOMPATIBILIDAD

BIOTRON® PLUS es compatible con insecticidas y fungicidas agrícolas, pudiendo aplicarse conjuntamente. Si tiene dudas, realizar una pequeña prueba de compatibilidad previamente y/o consulte a nuestro Departamento Técnico.

PERIODO DE CARENCIAS Y TIEMPO DE REINGRESO

No corresponde.

®**BIOTRON** es Marca Registrada