

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: glufosinato de amonio pertenece al grupo químico de los organofosfinatos. No comer, ni beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel, nunca manipular sin contar con los elementos de seguridad. El producto se debe manipular sólo por personas adultas y entrenadas en su manejo.

Equipo de protección personal: durante la preparación y aplicación: usar overol impermeable, máscara con filtro, guantes y botas impermeables y antiparras. No manipular en contra del viento y una vez terminada la manipulación cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua y jabón. No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto. No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos o piensos. Conservar el producto en una bodega con llave, fresca, seca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta. No almacenar junto a alimentos, semillas y forrajes.

Instrucciones para el triple lavado: vaciar el contenido del envase por 30 segundos. Agregar agua al envase hasta un cuarto de su capacidad y agitar durante 30 segundos. Verter en la máquina y mantener el envase en posición de descarga por 30 segundos. Repetir esta operación tres veces. Perforar el envase y eliminarlo de acuerdo con las disposiciones de la autoridad competente.

Información ecotoxicológica: a la dosis de aplicación recomendada **Fascinate® 150 SL**, es prácticamente no tóxico para aves, abejas, peces y daphnias y ligeramente tóxico para algas y lombrices.

Síntomas de intoxicación: disnea, mareos, diarrea y náuseas.

Antídoto: no existe antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios:

En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco. Si el afectado no respira, dar respiración artificial. Mantenga al afectado templado y en reposo.

En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar.

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente.

En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

En todos los casos, trasladar al afectado inmediatamente a un Centro Asistencial. Lleve la etiqueta o el envase del producto.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO. GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 2635 3800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA-CHILE: 2 2777 1994. El teléfono del importador es 2 2560 4500, Santiago, Chile.



Lote N°:
Fecha Vencimiento:

Autorización del Servicio
Agrícola y Ganadero N° 3.691

FASCINATE® 150 SL es un herbicida de contacto y de amplio espectro para el control no selectivo de malezas anuales, gramíneas y de hoja ancha en cultivos frutales, berries, vides, maíz y canola entre otros cultivos citados en el cuadro de Instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

Ingrediente Activo: % p/v
Glufosinato de amonio* 15 % (150 g/L)
Coformulantes c.s.p. 100 % (1 L)

(DL)-homoalanin-4-il(metil)fosfinato de amonio

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - CORROSIVO

Contenido Neto: L

Fabricado y Distribuido por:
Loating Yolo Bio-Technology Co. Ltd.
No. A-3, Tianjin Road, Loating Economic
Development Zone, Hebei Province, 063600,
China
UPL Limited
PLOT NO. 3101 /1, 3101 /2, 3101 /3
GIDC ANKLESHWAR.
INDIA.

Importado y distribuido por:
UPL Chile S.A.

El Rosal 4610, Huechuraba,
Santiago, Chile
ET3691V-003-0S2

Descripción: **Fascinate® 150 SL** es un herbicida de contacto y de amplio espectro para el control no selectivo de malezas anuales, gramíneas y de hoja ancha.

Equipo de aplicación: equipos de aspersión o nebulizadores para aplicación terrestre.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO:			
CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
	Malezas anuales: Rábano (<i>Raphanus sativus</i>), Yuyo (<i>Brassica rapa</i>), Lechuguilla (<i>Lactuca serriola</i>), Pichoga (<i>Euphorbia peplus</i>), Ortiga (<i>Urtica urens</i>), Senecio (<i>Senecio vulgaris</i>), Mostacilla (<i>Diplotaxis muralis</i>), Achicoria (<i>Cichorium intybus</i>) Sanguinaria (<i>Polygonum aviculare</i>), Verónica (<i>Veronica spp.</i>), Quilloy-quillo (<i>Stellaria media</i>), Vinagrillo (<i>Rumex acetosella</i>), Porotillo (<i>Fallopia convolvulus</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Bledo (<i>Amaranthus deflexus</i>), Tomatillo (<i>Solanum spp.</i>), Duraznillo (<i>Polygonum persicaria</i>), Malvilla (<i>Anoda hastata</i> L.), Manzanillón (<i>Anthemis cotula</i>), Ballicas (<i>Lolium spp.</i>), Piñillo (<i>Poa annua</i>), Avena (<i>Avena fatua</i>), Hualcacho (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Digitaria (<i>Digitaria sanguinalis</i>).	2-3	Aplicar en malezas con 2 a 3 hojas verdaderas. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Intervalo de aplicación: 30 - 40 días.
	Maleza anual : Coniza (<i>Conyza sp</i>)	3	Aplicar en post emergencia de la maleza.
	Desmanche de malezas perennes: Chépica (<i>Paspalum dilatatum</i>), Bromo (<i>Bromus catharticus</i>), Maicillo (<i>Sorghum halepense</i>), Chufa (<i>Cyperus rotundus</i> L.), Pasto bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>), Malva (<i>Malva nicaensis</i>), Pila-pila (<i>Modiola caroliniana</i>), Correhuela (<i>Convolvulus arvensis</i>).	2% (2 L/100 L de agua)	Aplicar en malezas con 2 a 3 hojas verdaderas. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Intervalo de aplicación: 30 - 40 días.
Maíz	Maleza perenne : Epilobio (<i>Epilobium ciliatum</i>)	3	Aplicar en post emergencia de la maleza.
	Malezas anuales: Rábano (<i>Raphanus sativus</i>), Yuyo (<i>Brassica rapa</i>), Lechuguilla (<i>Lactuca serriola</i>), Pichoga (<i>Euphorbia peplus</i>), Ortiga (<i>Urtica urens</i>), Senecio (<i>Senecio vulgaris</i>), Mostacilla (<i>Diplotaxis muralis</i>), Achicoria (<i>Cichorium intybus</i>), Sanguinaria (<i>Polygonum aviculare</i>), Verónica (<i>Veronica spp.</i>), Quilloy-quillo (<i>Stellaria media</i>) Vinagrillo (<i>Rumex acetosella</i>), Porotillo (<i>Fallopia convolvulus</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Bledo (<i>Amaranthus deflexus</i>), Tomatillo (<i>Solanum spp.</i>), Duraznillo (<i>Polygonum persicaria</i>), Malvilla (<i>Anoda hastata</i>), Manzanillón (<i>Anthemis cotula</i>), Ballicas (<i>Lolium spp.</i>), Piñillo (<i>Poa annua</i>), Avena (<i>Avena fatua</i>), Hualcacho (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Digitaria (<i>Digitaria sanguinalis</i>).	2-3	Aplicar solo en la entre hilera en malezas con 2 a 3 hojas verdaderas y repetir cuando las malezas alcancen nuevamente el estado fenológico anterior. Evite deriva al cultivo. Aplicaciones por temporada: 3 máx.
			Aplicar solo en la entre hilera en malezas con 2 a 3 hojas verdaderas y repetir cuando las malezas alcancen nuevamente el estado fenológico anterior. Evite deriva al cultivo. Aplicaciones por temporada: 3 máx.
Canola	Malezas anuales: Rábano (<i>Raphanus sativus</i>), Yuyo (<i>Brassica rapa</i>), Lechuguilla (<i>Lactuca serriola</i>), Pichoga (<i>Euphorbia peplus</i>), Ortiga (<i>Urtica urens</i>), Senecio (<i>Senecio vulgaris</i>), Mostacilla (<i>Diplotaxis muralis</i>), Achicoria (<i>Cichorium intybus</i> L.), Sanguinaria (<i>Polygonum aviculare</i>), Verónica (<i>Veronica spp.</i>), Quilloy-quillo (<i>Stellaria media</i>), Vinagrillo (<i>Rumex acetosella</i>), Porotillo (<i>Fallopia convolvulus</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Bledo (<i>Amaranthus deflexus</i>), Tomatillo (<i>Solanum spp.</i>), Duraznillo (<i>Polygonum persicaria</i>), Malvilla (<i>Anoda hastata</i>), Manzanillón (<i>Anthemis cotula</i>), Ballicas (<i>Lolium spp.</i>), Piñillo (<i>Poa annua</i>), Avena (<i>Avena fatua</i>), Hualcacho (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Digitaria (<i>Digitaria sanguinalis</i>).	2% (2 L/100 L de agua)	Para malezas anuales aplicar con 2 a 3 hojas verdaderas y repetir cuando las malezas alcancen nuevamente el estado fenológico anterior. Para malezas perennes aplicar al momento de mayor susceptibilidad.
	Desmanche de malezas perennes: Chépica (<i>Paspalum dilatatum</i>), Bromo (<i>Bromus catharticus</i>), Maicillo (<i>Sorghum halepense</i>), Chufa (<i>Cyperus rotundus</i>), Pasto bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>), Malva (<i>Malva nicaensis</i>), Pila-pila (<i>Modiola caroliniana</i>), Correhuela (<i>Convolvulus arvensis</i>).		
	Malezas anuales: Arvejilla (<i>Vicia sativa</i>), Calbacillo (<i>Silene gallica</i>), Pasto pinto (<i>Spergula arvensis</i>), Viola (<i>Viola arvensis</i>)	3-5	
Bordes de caminos Canales Barbechos químicos	Malezas perenne: Siete venas (<i>Plantago lanceolata</i>)	4-5	
	Cola de zorro (<i>Cynosurus echinatus</i>)	4-5	
	Control de regeneración natural de Pino (<i>Pinus radiata</i>).	2-4	Realizar una aplicación post-emergente sobre la regeneración natural del pino, en plantas de hasta 30 cm. Aplicar la dosis mayor cuando las plantas tengan un mayor desarrollo. Aplicación por temporada: 1.

Utilizar el siguiente rango de mojado en cada cultivo:

Frutales, Berries, Vides, Maíz, Canola y Bordes de caminos, Canales, Barbechos químicos: 200 - 300 L de agua/ha.

Preparación de la mezcla: llene con agua hasta la mitad el estanque del equipo aplicador y agregue la cantidad recomendada de **Fascinate® 150 SL**, luego complete hasta el volumen deseado, manteniendo una agitación constante.

Precauciones:

- Usar la dosis mayor con alta presión de malezas, de lo contrario usar la dosis menor.
- No aplicar con viento mayor a 8 km/ha que provoque deriva del producto a cultivos adyacentes.
- Usar pantalla protectora o boquilla anti deriva en su aplicación.
- No aplicar sobre partes verdes o corteza inmadura, evitar la deriva.
- En frutales y vides eliminar previo a la aplicación sierpes, brotes inferiores y/o hijuelos. No aplicar en huertos nuevos con árboles sin troncos totalmente lignificados.
- No se recomienda aplicar con bajo volumen de agua (maquinaria electrostática o en tratamientos de ULV).
- No aplicar si existe riesgo de heladas, lluvia inminente o con agua libre en la superficie del follaje.
- No se recomienda aplicar con maquinaria electrostática o en tratamiento con bajo de volumen de agua.
- No aplicar con temperaturas menores a 18 °C y mayores a 30 °C.
- Lavar cuidadosamente el equipo de aplicación, inmediatamente después de realizada la aplicación, para evitar daños en el equipo y los accesorios utilizados.
- Para evitar daños por fitotoxicidad, el equipo de aplicación debe estar limpio, sobre todo si se han realizado aplicaciones con sulfonilureas u otros.
- No aplicar en huertos nuevos, en que la base de los árboles tenga tejido verde y que sus troncos no estén completamente suberificados.
- No aplicar al follaje de ningún cultivo o huerto frutal, ni en presencia de sierpes, brotes inferiores y/o hijuelos.
- Fitotoxicidad:** no es fitotóxico si es aplicado siguiendo las instrucciones de uso indicadas en esta etiqueta y cuando las condiciones del cultivo son las óptimas.
- Compatibilidad:** compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala.
- Incompatibilidad:** Es incompatible con productos de reacción alcalina y fuertemente oxidantes.
- Carencia:** no corresponde debido a su forma y época de aplicación.
- Tiempo de reingreso al área tratada:** para personas 12 horas, después de ser aplicado; para animales no corresponde, ya que el objetivo productivo de los cultivos no es la alimentación animal.
- Nota del fabricante:** el fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las malezas para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.



CUIDADO

