

| CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO (continuación): | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CULTIVO | MALEZAS | DOSIS (L/ha) | OBSERVACIONES |
| Almendro, Arándano, Avellano, Boysenberry, Cerezo, Ciruelo, Cranberry, Damasco, Duraznero, Elderberry, Frambueso, Gooseberry, Limonero, Loganberry, Manzano, Mora, Naranja, Nectarino, Nogal, Olivo, Palto, Peral, Pomelo, Uva de mesa, Uva vinífera, Uva pisquera, Zarpaparrilla | Maleza anual: Coniza (<i>Conyza sp</i>) | 3 | Aplicar en post emergencia de la maleza. |
| | Desmanche de malezas perenne: Chépica (<i>Paspalum dilatatum</i>), Bromo (<i>Bromus catharticus</i>), Maicillo (<i>Sorghum halepense</i>), Chufa (<i>Cyperus rotundus L.</i>), Pasto bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>), Malva (<i>Malva nicaensis</i>), Pila-pila (<i>Modiola caroliniana</i>), Correhuela (<i>Convolvulus arvensis</i>). | 2% (2 L/100 L de agua) | Aplicar en malezas con 2 a 3 hojas verdaderas. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Intervalo de aplicación: 30 - 40 días. |
| | Maleza perenne: Epilobio (<i>Epilobium ciliatum</i>) | 3 | Aplicar en post emergencia de la maleza |
| Maíz | Malezas anuales: Rábano (<i>Raphanus sativus</i>), Yuyo (<i>Brassica rapa</i>), Lechuguilla (<i>Lactuca serriola</i>), Pichoga (<i>Euphorbia peplus</i>), Ortiga (<i>Urtica urens</i>), Senecio (<i>Senecio vulgaris</i>), Mostacilla (<i>Diploxix muralis</i>), Achicoria (<i>Cichorium intybus</i>), Sanguinaria (<i>Polygonum aviculare</i>), Verónica (<i>Veronica spp.</i>), Quilloy-quilloy (<i>Stellaria media</i>), Vinagrillo (<i>Rumex acetosella</i>), Porotillo (<i>Fallopia convolvulus</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Bledo (<i>Amaranthus deflexus</i>), Tomatillo (<i>Solanum spp.</i>), Duraznillo (<i>Polygonum persicaria</i>), Malvilla (<i>Anoda hastata</i>), Manzanillón (<i>Anthemis cotula</i>), Ballicas (<i>Lolium spp.</i>), Piojillo (<i>Poa annua</i>), Avena (<i>Avena fatua</i>), Hualcacho (<i>Echinochloa cruz-galli</i>), Digitalia (<i>Digitaria sanguinalis</i>). | 2 – 3 | Aplicar solo en la entre hilera en malezas con 2 a 3 hojas verdaderas y repetir cuando las malezas alcancen nuevamente el estado fenológico anterior. Evite deriva al cultivo. Aplicaciones por temporada: 3 máx. |
| Canola | | | Aplicar solo en la entre hilera en malezas con 2 a 3 hojas verdaderas y repetir cuando las malezas alcancen nuevamente el estado fenológico anterior. Evite deriva al cultivo. Aplicaciones por temporada: 3 máx. |

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO (continuación):

| CULTIVO | MALEZAS | DOSIS (L/ha) | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bordes de caminos Canales Barbechos químicos | Malezas anuales: Rábano (<i>Raphanus sativus</i>), Yuyo (<i>Brassica rapa</i>), Lechuguilla (<i>Lactuca serriola</i>), Pichoga (<i>Euphorbia peplus</i>), Ortiga (<i>Urtica urens</i>), Senecio (<i>Senecio vulgaris</i>), Mostacilla (<i>Diploaxis muralis</i>), Achicoria (<i>Cichorium intybus L.</i>), Sanguinaria (<i>Polygonum aviculare</i>), Verónica (<i>Veronica spp.</i>), Quilloy-quilloy (<i>Stellaria media</i>), Vinagrillo (<i>Rumex acetosella</i>), Porotillo (<i>Fallopia convolvulus</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Bledo (<i>Amaranthus deflexus</i>), Tomatillo (<i>Solanum spp.</i>), Duraznillo (<i>Polygonum persicaria</i>), Malvilla (<i>Anoda hastata</i>), Manzanillón (<i>Anthemis cotula</i>), Ballicas (<i>Lolium spp.</i>), Piojillo (<i>Poa annua</i>), Avena (<i>Avena fatua</i>), Hualcachos (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Digitaria (<i>Digitaria sanguinalis</i>). Desmanche de malezas perennes: Chépica (<i>Paspalum dilatatum</i>), Bromo (<i>Bromus catharticus</i>), Maicillo (<i>Sorghum halepense</i>), Chufa (<i>Cyperus rotundus</i>), Pasto bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>), Malva (<i>Malva nicaensis</i>), Pila-pila (<i>Modiola caroliniana</i>), Correhuela (<i>Convolvulus arvensis</i>). | 2% (2 L/100 L de agua) | Para malezas anuales aplicar con 2 a 3 hojas verdaderas y repetir cuando las malezas alcancen nuevamente el estado fenológico anterior. Para malezas perennes aplicar al momento de mayor susceptibilidad. |
| | Malezas anuales: Arvejilla (<i>Vicia sativa</i>), Calabacillo (<i>Silene gallica</i>), Pasto pinito (<i>Spergula arvensis</i>), Viola (<i>Viola arvensis</i>) Maleza perenne: Siete venas (<i>Plantago lanceolata</i>) | 3-5 | |
| | Cola de zorro (<i>Cynosurus echinatus</i>) | 4-5 | |
| | Pino (<i>Pinus radiata</i>) | Control de regeneración natural de Pino (<i>Pinus radiata</i>) | 2-4 |

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Llene con agua hasta la mitad el estanque del equipo aplicador y agregue la cantidad recomendada de **FASCINATE® 150 SL**, luego complete hasta el volumen deseado, manteniendo una agitación constante.

PRECAUCIONES

- Usar la dosis mayor con alta presión de malezas, de lo contrario usar la dosis menor.
- No aplicar con viento mayor a 8 km/ha que provoque deriva del producto a cultivos adyacentes.
- Usar pantalla protectora o boquilla anti deriva en su aplicación.
- No aplicar sobre partes verdes o corteza inmadura, evitar la deriva.
- En frutales y vides eliminar previo a la aplicación sierpes, brotes inferiores y/o hijuelos. No aplicar en huertos nuevos con árboles sin troncos totalmente lignificados.
- No aplicar si existe riesgo de heladas, lluvia inminente o con agua libre en la superficie del follaje.
- No se recomienda aplicar con maquinaria electroestática o en tratamiento con bajo volumen de agua.
- No aplicar con temperaturas menores a 18 °C y mayores a 30 °C.
- Lavar cuidadosamente el equipo de aplicación, inmediatamente después de realizada la aplicación, para evitar daños en el equipo y los accesorios utilizados.
- Para evitar daños por fitotoxicidad, el equipo de aplicación debe estar limpio, sobre todo si se han realizado aplicaciones con sulfonilureas u otros.
- No aplicar en huertos nuevos, en que la base de los árboles tenga tejido verde y que sus troncos no estén completamente suberificados.
- No aplicar al follaje de ningún cultivo o huerto frutal, ni en presencia de sierpes, brotes inferiores y/o hijuelos.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si es aplicado siguiendo las instrucciones de uso indicadas en esta etiqueta y cuando las condiciones del cultivo son las óptimas.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

CARENCIA

No corresponde debido a su forma y época de aplicación.

TIEMPO DE REINGRESO AL AREA TRATADA

Para personas 12 horas, después de ser aplicado; para animales no corresponde, ya que el objetivo productivo de los cultivos no es la alimentación animal.

® Fascinate es marca registrada.