

SIMAZINA 90% WG

HERBICIDA

INFORMACIÓN GENERAL

INGREDIENTE ACTIVO	Simazina 90% WG
GRUPO QUÍMICO	1,3,5 - triazinas.
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN	90.0% (900 g/kg)
MODO DE ACCIÓN	Herbicida selectivo de preemergencia, con acción residual sistémico y selectivo
FABRICANTE/FORMULADOR	AGROSPEC S.A., Chile
DISTRIBUIDOR EN CHILE	UPL Chile S.A.
TOXICIDAD	Grupo IV, Producto que normalmente no ofrecen peligro. Banda toxicológica verde LD50 Producto comercial: Oral ratas: > 2000 mg/kg Dermal ratas: > 2000 mg/kg
ANTÍDOTO	No existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático
AUTORIZACIÓN SAG N°	3.597

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

SIMAZINA 90% WG es un herbicida selectivo de preemergencia, con acción residual sistémico y selectivo para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha en frutales, espárragos, lupino y plantaciones forestales, señaladas en el cuadro de instrucciones de uso de esta etiqueta.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO APLICACIÓN TERRESTRE

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (Kg/ha)	OBSERVACIONES
Arándano, Frambueso, Mora, Zarparrilla	Malezas de hoja ancha: Amapola roja, Bledo, Bolsita del pastor, Clonqui, Core core, Diente de León, Duraznillo, Hierba de la culebra, Manzanilla hedionda, Ñilhue, Ortiga, Ortiga muerta, Pacoyuyo, Pichoga, Pimpinela escarlata o Pimpinela azul, Quilloi-Quilloi, Quinguilla, Rábano, Sanguinaria, Senecio o hierba cana, Tomatillo, Verdolaga, Verónica, Vicia o arvejilla, Violeta y Yuyo.	2,0 - 3,5	Aplicar previo a la emergencia de las malezas en periodo de lluvia a fin de incorporar y activar el herbicida. No aplicar en plantas con menos de 3 años de establecimiento, ni en suelos arenosos. Usar la dosis más alta en suelos más pesados y con mayor contenido de materia orgánica. Mojamiento mínimo: 100 L de agua /ha N° de aplicaciones por temporada 1 – 2
Almendro, Clementino, Damasco, Duraznero, Kiwi, Limonero, Manzano, Naranja, Nectarino, Nogal, Olivo, Palto, Peral, Pomelo, Vides		2,0 - 4,0	
Espárrago	Malezas de hoja angosta (gramíneas): Avenilla, Ballica, Bromo, Chépica o pasto quila, Hualcacho, Poa o piojillo		Aplicar antes de la emergencia de los turiones y en suelo libre de malezas. En el caso de espárrago blanco aplicar inmediatamente después de la aporca y regar si no llueve. No aplicar en el cultivo, si éste tiene menos de 1 año de establecimiento. Mojamiento mínimo: 300 L de agua / ha N° aplicaciones por temporada: 1.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO APLICACIÓN TERRESTRE (Continuación):			
CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (Kg/ha)	OBSERVACIONES
Eucaliptus	Malezas de hoja ancha: Amapola roja, Bledo, Bolsita del pastor, Clonqui, Core core, Diente de León, Duraznillo, Hierba de la culebra, Manzanilla hedionda, Ñilhue, Ortiga, Ortiga muerta, Pacoyuyo, Pichoga, Pimpinela escarlata o Pimpinela azul, Quilloi- Quilloi, Quinguilla, Rábano, Sanguinaria, Senecio o hierba cana, Tomatillo, Verdolaga, Verónica, Vicia o arvejilla, Violeta y Yuyo. Malezas de hoja angosta (gramíneas): Avenilla, Ballica, Bromo, Chépica o pasto quila, Hualcacho, Poa o piojillo	2,0 – 4,0	Aplicar de pre y post-plantación, previo a la emergencia de las malezas sobre suelo húmedo y limpio de malezas. Usar las dosis más altas en suelos más pesados y con mayor contenido de materia orgánica. Mojamiento mínimo: 100 L de agua / ha. Nº aplicaciones por temporada: 1.
Lupino	Malezas de hoja ancha: Achicoria, Amor seco, Berro, Bledo, Bolsita del pastor, Cardo, Chamico, Core-core, Diente de León, Duraznillo, Pacoyuyo, Gallito, Hierba azul, Hierba cana o Senecio, Hierba de la culebra, Hierba del chanco, Hualputra, Manzanilla hedionda, manzanillón, Mostacilla o Mostaza, Ñilhue, Ortiga, Ortiga muerta, Pasto pinito, Pega-pega, Pichoga, Pimpinela escarlata o Pimpinela azul, Quilloi- Quilloi, Quinguilla, Rábano, Rapistro, Retamillo, Sanguinaria, Senecio anual, Verdolaga, Verónica, Vicia o arvejilla, Vinagrillo, Viola, Yuyo. Malezas de hoja angosta (gramíneas): Avenilla, Ballica, Bromo, Chépica, Hualcacho, Pata de gallina, Poa o piojillo.	1,25 – 2,0	Aplicar en pre-emergencia del cultivo y de las malezas. No aplicar en suelos arenosos. Usar las dosis más altas en suelos más pesados y con mayor contenido de materia orgánica. Mojamiento mínimo: 100 L de agua / ha. Nº aplicaciones por temporada: 1.
Cerezo	Malezas de hoja ancha: Achicoria, Amor seco, Berro, Bledo, Bolsita del pastor, Cardo, Chamico, Core-core, Diente de León, Duraznillo, Pacoyuyo, Gallito, Hierba azul, Hierba cana o Senecio, Hierba de la culebra, Hierba del chanco, Hualputra, Manzanilla hedionda, manzanillón, Mostacilla o Mostaza, Ñilhue, Ortiga, Ortiga muerta, Pasto pinito, Pega-pega, Pichoga, Pimpinela escarlata o Pimpinela azul, Quilloi- Quilloi, Quinguilla, Rábano, Rapistro, Retamillo, Sanguinaria, Senecio anual, Verdolaga, Verónica, Vicia o arvejilla, Vinagrillo, Viola, Yuyo. Malezas de hoja angosta (gramíneas): Avenilla, Ballica, Bromo, Chépica, Hualcacho, Pata de gallina, Poa o piojillo.	2,5 - 3,5	Aplicar previo a la emergencia de las malezas en período de lluvias, a fin de incorporar y activar el herbicida. No aplicar en plantas con menos de 3 años de establecimiento, ni en suelos arenosos. Usar las dosis más altas en suelos más pesados y con mayor contenido de materia orgánica. Mojamiento mínimo: 100 L de agua / ha. Nº aplicaciones por temporada: 1 - 2.
Plantaciones de pino	Malezas de hoja ancha: Achicoria, Amor seco, Berro, Bledo, Bolsita del pastor, Cardo, Chamico, Core-core, Diente de León, Duraznillo, Pacoyuyo, Gallito, Hierba azul, Hierba cana o Senecio, Hierba de la culebra, Hierba del chanco, Hualputra, Manzanilla hedionda, manzanillón, Mostacilla o Mostaza, Ñilhue, Ortiga, Ortiga muerta, Pasto pinito, Pega-pega, Pichoga, Pimpinela escarlata o Pimpinela azul, Quilloi- Quilloi, Quinguilla, Rábano, Rapistro, Retamillo, Sanguinaria, Senecio anual, Verdolaga, Verónica, Vicia o arvejilla, Vinagrillo, Viola, Yuyo. Malezas de hoja angosta (gramíneas): Avenilla, Ballica, Bromo, Chépica, Hualcacho, Pata de gallina, Poa o piojillo.	2,5 - 4,0	Aplicar de pre y/o post-plantación, previo a la emergencia de las malezas en período de lluvias. Realizar la aplicación de pre-plantación al menos 15 días antes de la plantación. Usar las dosis más altas en suelos más pesados y con mayor contenido de materia orgánica. Mojamiento mínimo: 100 L de agua / ha. Nº aplicaciones por temporada: 2*.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO APLICACIONES AÉREAS:			
CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (Kg/ha)	OBSERVACIONES
Plantaciones de pino	Malezas de hoja ancha: Achicoria, Amor seco, Berro, Bledo, Bolsita del pastor, Cardo, Chamico, Core-core, Diente de León, Duraznillo, Pacoyuyo, Gallito, Hierba azul, Hierba cana o Senecio, Hierba de la culebra, Hierba del chanco, Hualputra, Manzanilla hedionda, manzanillón, Mostacilla o Mostaza, Ñilhue, Ortiga, Ortiga muerta, Pasto pinito, Pega-pegas, Pichoga, Pimpinela escarlata o Pimpinela azul, Quilloi- Quilloi, Quinguilla, Rábano, Rapistro, Retamillo, Sanguinaria, Senecio anual, Verdolaga, Verónica, Vicia o arvejilla, Vinagrillo, Viola, Yuyo Malezas de hoja angosta (gramíneas): Avenilla, Ballica, Bromo, Chépica, Hualcacho, Pata de gallina, Poa o piojillo.	2,5 - 4,0	Aplicar de pre y/o post plantación, previo a la emergencia de las malezas en periodo de lluvia. Realizar la aplicación de pre-plantación al menos 15 días antes de la plantación. Usar las dosis más altas en suelos más pesados y con mayor contenido de materia orgánica. Mojamiento mínimo: 15 - 40 L de agua/ha N° aplicaciones por temporada: 2*

* en el caso de realizar 2 aplicaciones, el intervalo entre ellas debe ser al menos 4 meses

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agregar SIMAZINA 90% WG, al estanque de aplicación a medio llenar, con el agitador en funcionamiento, luego completar el estanque y aplicar

PRECAUCIONES

Cultivos sensibles como arroz, avena, cebollas, cucurbitáceas, lechuga, remolacha, tomate, trigo, trébol, zanahoria, debe transcurrir 1 año para su establecimiento. Para una aplicación segura y eficaz del producto, no aplicar con viento excesivo (más de 8 km/hr), y no aplicar con altas T° (mayores a 28°C).

FITOTOXICIDAD

Usado de acuerdo a las instrucciones de uso de la etiqueta SIMAZINA 90% WG no produce fitotoxicidad.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los pesticidas de uso corriente, sin embargo, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala si se desea mezclar con otro producto.

PERIODO DE CARENIA

No corresponde indicar carencia.

TIEMPO DE REINGRESO

Como resguardo para el ingreso de personas, no ingresar al área tratada antes de 12 horas después de la aplicación. Para animales no corresponde indicar tiempo de reingreso al área tratada, por tratarse de cultivos cuya producción no está destinada a la alimentación animal.

® es Marca Registrada